



Ošetrovatelství maturitní otázky

Crohnova choroba, ulcerózní kolitida průjmy + stolice


Tenké střevo (intestinum tenue)

- Navazuje na žaludek jako trubice o délce 3-5 metru
- Mezi hlavní funkce patří štěpení, vstřebávání živin, peristaltické pohyby
- Sliznice je tvořena KLKY




Tlusté střevo (intestinum crassum)

- Poslední část trávicí trubice, která přijímá kašovitý až tekutý obsah
- Obsah tlustého střeva je formován ve stolici
- Prostá sliznice 1,5 metru dlouhá
- Zajišťuje hnilobný proces



Dvanáctník (duodenum)

- Součást tenkého střeva
- Podkovovitě stočená počáteční část tenkého střeva navazující na žaludek
- Duodenum je úsek tenkého střeva, kde probíhá vstřebávání (resorpce)



Tenké střevo

- Duodenum
- Tračník (jejunum)
- Kyčelník (illeum)

Tlusté střevo

- Vzestupný tračník (colon ascendens)
- Příčný tračník (colon transversus)
- Sestupný tračník (colon descendens)

Průjmy:

časté vyprazdňování vodnaté řídké stolice

Crohnova choroba (CH):

chronické → zánětlivé → autoimunitní onemocnění střev

Ulcerózní kolitida (UC):


chronické → zánětlivé → autoimunitní onemocnění střev a sliznice

Příznaky u průjmu: častý odchod řídké stolice, bolest břicha, nadýmání


Příznaky ulcerózní kolitida, Crohnova choroba: neurčité, průjem, zácpa, příměsi ve stolici, změna tělesné hmoty, artritida, stomatitida, bolest břicha

Příčiny:

průjem	ulcerózní kolitida, Crohnova choroba
stres	idiopatická = neznámá
dietní chyba	kouření
infekční onemocnění	dědičnost
onemocnění GIT	alkohol
metabolická/endokrinní onemocnění	špatné stravování
idiopatická = neznámá	psychika
další léky	užívání ATB



Prevence: Neznámá, důvod autoagresivity imunitního systému není vysvětlen.



Diagnostika:

Anamnéza	OA (kouření, alkohol, strava), PA (stres)
FF = fyziologické funkce	subfebrilie/febrilie, tachykardie
Pohled, pohmat, poklep, poslech = fyzikální vyšetření	úbytek hmotnosti, stolice, bolestivé projevy
Laboratorní odběry	HTO KO+diff OKBD CRP OLM K+C
Zobrazovací metody	irigografie, CT, MR
Endoskopické vyšetření	kolonoskopie, gastrokopie

Léčba:

a) konzervativní průjem = úprava životního stylu, smecta, střevní dezinficencia

konzervativní UC, CH = imunosupresiva, kortikoidy, dietoterapie sulfonamid

b) chirurgicky = resekce části střev

Stolice:

- monitorace zápachu, příměsí, množství, barva, forma stolice
- sledovat jak často pacient vyprazdňuje