

Ošetrovatelství maturitní otázky


Bércové vředy + Převazy, převazový vozík

Kůže (derma)

- Je to největší orgán lidského těla
- Slouží jako ochranný štít, informuje nás o okolním prostředí (např. pocením)
- Kůže je pružná, chrání hlouběji uložené tkáně před zraněním dehydratací...

Struktura kůže:

- Pokožka (epidermis) – dlaždicový epitel tvořící povrchovou vrstvu kůže
- Škára (dermis) – pojivová tkáň ležící pod pokožkou
- Podkožní vazivo (tela subcutanea) – není součástí kožního systému



Fyziologie:

- **Ochranná funkce** – Chrání před mechanickým a chemickým poškozením.
- **Smyslová funkce** – Vnímá teplo, chlad, bolest pomocí receptorů.
- **Skladovací funkce** – ukládá vitamíny A,D,E,K


Bércové vředy:

chronické → nezánettivé → neinfekční poškození kůže → zasahuje různě hluboko do podkožních tkání → nejčastěji na vnitřní straně kotníku a na bérce

Příčiny: genetická dispozice, obezita, nedostatek pohybu, špatná obuv, drobná poranění, varixy, žilní spojky (perforátory)

Dekubitus st.: I, II, III, IV. Bércový vřed: žilní/tepenný/smíšený Diabetická rána Dehiscence Jiná:	Velikost (š x d x h) v cm: Okolí: klidné/macerace/zánět/ekzém/suché/hematom Okraje: klidné/otok/navalitě Sekrece: žádná/mírná/střední/velká Sekret: serózní/hnisavý/krvavý Zápach: ano/ne Barva rány: ☐ ☐ ☐ ☐	Debridement: ano/ne Výměna sekundárního krytí: ano/ne Datum dalšího převazu:
--	--	---

Příznaky: otok (edém), zarudnutí, zteplání, nekróza, bolest



Diagnostika:

Anamnéza	OA (rizikové faktory), RA (dědičnost), PA (práce neustále vsedě), GA (těhotenství)
FF = fyziologické funkce	subfebrilie/febrilie při zánětu
Pohled, pohmat, poklep, poslech = fyzikální vyšetření	bolestivost, zápach
Laboratorní odběry	OLM K+C, hemokultura
Zobrazovací metody	UZ, RTG, flebografie (s kontrastní látkou)

Léčba:

a) konzervativní = elevace DK, vyvarovat se dlouhému stání a sezení

komprese DK, ATB, antikoagulancia, venofarmaka (detralex)

antiflogistika (proti zánětu), vlhké hojení ran (Inadine)

b) chirurgicky = odstranění nekrotické tkáně, obnovení průtoku krve (by pass...)

Převazy, převazový vozík:

- oplach rány jedinec borová voda, DebridecaSan
- cíl léčby je ránu zhojit a předejít zánětu
- sterilní pomůcky, sterilní rukavice, sterilní vozík
- fáze hojení ran: čištění, granulace, epitelizace
- asistujeme lékaři, pracujeme asepticky
- po převazu uklidit veškerý materiál a důkladná dezinfekce rukou

